

Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae)

Richard Maurer

ZUSAMMENFASSUNG

Neue Funde von *Cybaeus* in den Südalpen führten zu einer Überprüfung der südeuropäischen Arten: *C. angustiarum* L.KOCH ist auf Mitteleuropa nördlich der Alpen und Osteuropa beschränkt. Der bisherige "*C. angustiarum*" der Südalpen zerfällt in *C. montanus* n.sp. und *C. intermedius* n.sp., die Tiere der französischen Pyrenäen sind als *C. raymondi* SIMON 1916 zu bezeichnen (von SIMON anlässlich der Erstbeschreibung zu *Cicurina* gestellt). *C. minorsensu* BRIGNOLI 1978 (Türkei) ist eine distinkte Art, die mit *C. brignolii* benannt wird. *C. minor*, *C. intermedius* und *C. montanus* bilden die minor-Gruppe, welcher *C. vignai* (Meeralpen) und *C. raymondi* (Pyrenäen) nahestehen. Für *Cybaeus* als Gattung montaner Waldgesellschaften wird präglaziale Einwanderung aus Osten erwogen, für die südwestlichen und südlichen Arten glaziale Überdauerung der Vorläufer in Reliktpopulationen.

LITERATUR

MAURER, R.- (im Druck): Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae) Beschreibung von *C. montanus* n.sp. und *C. intermedius* n.sp. Rev. suisse Zool.

Richard Maurer
Kirchrain 1
CH-5113 Holderbank

REVUE
DE
SCIENCE
NATURELLE
NEUCHÂTEL